

# 令和3年 鹿児島県南薩地区(えい)茶園状況

3月26日現在の新芽生育状況です。

## ●雪丸タケ(ユタカミドリ)



## ●一氏(ユタカミドリ)



## ●飯伏



## ●瀬谷



## ●茂2号



# 令和3年 一番茶芽生育状況について

日時: 令和3年 3月 26日 場所: 頰娃町(12か所) 品種: ゆたかみどり

## 【結果】

表1. ゆたかみどり定点の萌芽率と芽長(早場～遅場 12カ所の平均値)

調査日	萌芽率(%), 開葉数(葉)				芽長(mm)			
	R3	R2 平年並	H31 平年並	H30 <b>早い年</b>	R3	R2	H3 1	H30
3/5	12%	6%	3%	20%	12	8.9	8.4	9.0
3/12	60%	48%	36%	73%	18	14	13	15
3/19	1.1 葉 (0~1.5)	0.3 葉 (0~1)	0.4 葉 (0~1)	1.5 葉 (0.8~2.2)	34	19	18	34
3/25	<b>2.7 葉</b> (2.2~3.2)	1.5 葉 (1~2.5)	1.5 葉 (1~2.3)	2.4 葉 (1.8~3)	<b>63</b>	33	32	49

気温が高く推移し、生育は4～5日早い傾向にある。1枚展開するのに約4.5日の早さで生育している。平均値からみると、ゆたかみどり被覆は今週末～来週頭から本格化していくことが予想される。




図2. 2/15を起算とした平均気温10℃以上の有効積算温度

耐凍性が弱まってくる2/15から10℃を越えた分の温度を積算していき、180～200℃に達した時期が摘採開始日に近似する傾向がある。上図をみると、3/25時点で令和3年は169℃。3月に入り一日あたり平均5℃積み上がっており、200℃まであと6日程度。